

感染症の登園基準

船越認定こども園

	病名	主な症状	登園に関して	完治証明有無
1	水ぼうそう (水痘)	微熱、赤くかゆみの強い発疹。その後、半日から1日で、顔、口の中、胸、背中、手足、頭皮に広がる。	全ての発疹がかさぶたになるまで。	有
2	おたふくかぜ (流行性耳下腺炎)	発熱、耳下腺で炎症が起こり、耳の下からあごにかけて腫れと痛みが出る。	はれが発現した後5日を経過し、かつ全身状態がよくなるまで。	有
3	インフルエンザ	喉の痛み、咳、鼻水などの風邪の症状から始まり、40℃前後の高熱が出て、関節痛などの全身症状が出る。	発症した後(発熱の翌日を1日目として)5日を経過し、かつ解熱した後3日を経過するまで。	報告書を記入
4	アデノウイルス プール熱 (咽頭結膜熱)	高熱、喉のはれや痛みと同時に、結膜炎(目やに、目の痛み、充血など)が起こる。	症状が消えてから、2日経過するまで。	有
5	流行性角結膜炎 (はやり目)	充血と目やに、まぶたのはれや痛み、涙を流したりする。	症状が治まり、医師が認めたとき。	有
6	溶連菌感染症	高熱、のどの痛み、莓舌、おう吐や頭痛を起こすこともある。	抗生物質の服用を始めてから24時間経過するまで。※途中症状が治まっても、医師の指示通り抗生物質は飲み続けること。	無
7	手足口病	手のひら、足の裏、口の中などに水ぼうや赤い発疹ができる。(発熱など)	解熱後1日以上経過し、食事を普通にとれるようになるまで。※症状によって、自宅療養をお願いする場合があります。	無
8	PSウイルス感染症	風邪に似た症状から始まり、やがてひどく咳きこんだりする。	症状が治まり、全身状態が良くなるまで。	無
9	突発性発疹	高熱、2～3日後に腹部を始めとして淡い赤色をした発疹が出る。	解熱後1日以上経過し、発疹の赤みが薄くなり元気になるまで。	無
10	水いぼ (伝染性軟属腫)	球状のいぼ。腹部や手足、わきの下など、こすれる部分に広がりやすい。	登園可能。患部をかきこわしている場合は、医師が認めたとき。	無
11	とびひ (伝染性膿痂疹)	強いかゆみのある水ぼうやができる。かきこわして他の部分に付き、次々と水ぼうやが広がっていく。	患部が乾燥するか、または、患部をガーゼなどで覆うことができるまで。	無
12	マイコプラズマ肺炎	風邪の症状に似ているが、乾いた咳が長引く。※子どもが感染した場合、重症化することがある。	症状によって医師と相談、認めたとき。	無
13	ヘルパンギーナ	高熱、のどの痛み、口の中に口内炎のような症状や水泡、赤い発疹等が出る。食欲が落ちてしまうこともある。	発症後24時間熱が出なければ登園可能。※症状によって、自宅療養をお願いする場合があります。	無

【 登園停止期間の数え方 】

例	発症日	発症後5日間(登園停止期間)					発症後5日を経過				
	0日目	1日目	2日目	3日目	4日目	5日目	6日目	7日目	8日目	9日目	
発症後 1日目に 解熱した 場合		解熱 1日目 2日目 3日目					登園 OK				
発症後 2日目に 解熱した 場合			解熱 1日目 2日目 3日目				登園 OK				
発症後 3日目に 解熱した 場合				解熱 1日目 2日目 3日目				登園 OK			
発症後 4日目に 解熱した 場合					解熱 1日目 2日目 3日目				登園 OK		
発症後 5日目に 解熱した 場合						解熱 1日目 2日目 3日目				登園 OK	

※ 解熱(0日目)とは、1日を通して平熱の日となります。

※ ご不明な点がございましたら、職員までお声掛けください。